



| TILTAKSKORT FOR BARNEHAGE/ SFO / SKULE VED MARK / ORMESJUKDOM | |
|---|---|
| Om mark/ormesjukdom | Når det gjeld barnehage/skule/SFO er det hovudsakleg to typar marksjukdom som må nemnast, Barnemark og Hunde-/kattespulmark. |
| Kan barnet få sjukdomen fleire gonger? | Ja |
| Smittemåte | Barnemark smitter via markegg gjennom anus-finger-munn kontakt og via sengekle i same husstand. Hunde-/kattespulmark smittar oftast barn, som kan få egg i seg ved kontakt med jord som er forureina av avføring frå hund eller katt, for eksempel frå sandkasser. |
| Symptom og teikn til smitte | Kløe rundt endetarmsopning. Diagnose vert stilt ved direkte mikroskopi av teip som vert trykt mot analopninga. |
| Tiltak ved utbrot av marksjukdom | Ved mistanke om marksjukdom bør fastlege konsulterast for diagnostikk og behandling. Ved påvist barnemark bør alle i same husstand behandlast samtidig. Barnet kan vende tilbake til barnehage/skule/SFO dagen etter at behandling er igangsett. Det er ikkje grunnlag for å behandle alle barn eller tilsette i ein barnehage ved påvist tilfelle hos eit barnehgebarn. Ved reinfeksjon bør ein gjere andre førebyggjande tiltak som å klippe og skrubbe negler, skjerpe inn spesielt god hand- og toaletthygiene, hyppig byting av sengekle og nøye vask av toalettramme og leikar. Hunde-/kattespulmark førebyggas ved regelmessig utskifting av sand i sandkasser og inngjerding av sandkasser |
| Informasjon frå: https://fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/ https://helsenorge.no/sykdom/mage-og-tarm/barnemark https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928 | Treng du meir informasjon ta kontakt med helsesjukepleiar eller legekantoret |